

Spektrum zwalczanych chwastów

Dymnica pospolita	
Fiołek polny	
Gwiazdnica pospolita	
Jasnota purpurowa	
Komosa biała	
Pokrzywa żegawka	
Powój polny	
Przetacznik perski	
Przytulia czepna	
Psianka czarna	
Rdest plamisty	
Rdest powojowy	
Rdest ptasi	
Rdest szczawolistny	
Rumian polny	
Rumianek pospolity	
Skrzyp polny	
Starzec pospolity	
Szardłat szorstki	
Tasznik pospolity	
Tobotki polne	
Żółtlica drobnokwiatowa	


	Bardzo dobre	Dostateczne
	Dobre	Brak działania

Ważne ogniwo w zwalczaniu chwastów

Lentagran jest kontaktowym herbicydem przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach roślin warzywnych.

- Szerokie spektrum zwalczanych chwastów!
- Bardzo dobra selektywność w wielu uprawach!
- Możliwość stosowania dawek dzielonych oraz mieszania z innymi substancjami aktywnymi!
- Dobra skuteczność w trudnych warunkach atmosferycznych

Nowe rejestracje małoobszarowe!



Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Polska Północna:

Paweł Tuttlewski 692 673 001
Tomasz Satek 600 340 385
Piotr Ptasiewicz 606 746 745

Polska Południowa:

Nicol Kałuża 666 972 570
Andrzej Saborń 882 040 641
Karolina Dziubek 784 279 261

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.



Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa | Tel. (22) 243 28 85 | info-pl@belchim.com | www.belchim.pl

Lentagran®

Ważne ogniwo w zwalczaniu chwastów






LENTAGRAN 45 WP wykazuje wysoką skuteczność zwalczania wielu gatunków chwastów dwuliściennych. Wynika to z unikalnego mechanizmu działania substancji aktywnej – **pirydatu**. Dzięki temu można uzyskać niespotykane dotąd efekty!

Zalecenia holenderskie - kalafior i brokuł

2 zabiegi w dawkach dzielonych



W uprawach kalafiora i brokuła, tak samo jak w przypadku cebuli, bardzo często wykonuje się zabiegi ochrony przed chwastami w systemie dawek dzielonych. W Holandii producenci bardzo często stosują **Lentagran** dwukrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Pierwszy zabieg wykonywany jest mniej więcej 7-10 dni po sadzeniu w dawce 0,75 kg/ha (po przyjęciu się rozsady). Po 10-14 dniach powtarzany jest drugi zabieg w takiej samej dawce. Tym samym kalafior i brokuły są zabezpieczone przed chwastami w bardzo newralgicznym okresie – zanim zostaną zastonięte międzyrzędzia.

Zakres rejestracji:

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Cebula z siewu	Od fazy 3 liści właściwych cebuli	1,5 – 1,66 kg/ha
Por z siewu	Od fazy 3 liści właściwych pora	
Kapusta głowiasta z rozsady	1-3 tygodnie po wysadzeniu	
Kalafior, brokuł, kapusta brukselska z rozsady	1-3 tygodnie po wysadzeniu	
Kukurydza cukrowa	Od fazy 2 do 8 liści właściwych kukurydzy	
Mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, kozłek lekarski, babka lancetowata, kminek zwyczajny, koper ogrodowy, koper włoski, majeranek ogrodowy, biedrzynek anyż.	od fazy pierwszego do fazy trzeciego liścia właściwego	

Ważne ogniwo w zwalczaniu chwastów

LENTAGRAN 45 WP jest herbicydem, który można doskonale wkomponować w programy ochrony warzyw przed chwastami.

W momencie, gdy na plantacji poziom zachwaszczenia wzrasta, a w spektrum gatunków dominują chwasty wrażliwe na pirydat – zaleca się zastosowanie pełnej dawki Lentagranu (1,5 -1,66 kg/ha)

Chcąc niszczyć chwasty na plantacjach systematycznie, zaleca się aplikowanie dawek dzielonych. Ze względu na cechy substancji czynnej oraz formy handlowej (WP), Lentagran można mieszać z wieloma innymi środkami chwastobójczymi. W efekcie końcowym można uzyskać bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów, obniżyć koszty zabiegu na hektar oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń rośliny uprawnej.

- Lentagran należy stosować na młode chwasty w fazie od 2 do 4 liści właściwych.
- Stosować na rośliny z wykształconą warstwą woskową (min. 2 dni po ostatnich opadach).
- Preparatu nie należy stosować, gdy temperatury w nocy spadają poniżej 2 °C, a w dzień przekraczają 25 °C.
- Należy unikać aplikacji preparatu przed spodziewanym deszczem (do 2h).
- Preparatu nie należy stosować razem z adiuwantami, nawozami dolistnymi oraz graminicydami.



UWAGA!

Niektóre odmiany brokuła lub kalafiora mogą wykazywać większą wrażliwość na herbicydy kontaktowe. Wiąże się to z cechami odmianowymi takimi jak wykształcanie wątlęgo nalotu woskowego.

Aby uniknąć objawów fitotoksyczności należy wykonać na danej odmianie zabieg próbnny, bądź skonsultować się z naszymi doradcami!